

collection de feu Léon Fairmaire par le Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

L'étude de cette proposition est renvoyée au Conseil.

— Sur la proposition de M. P. Chabanaud, et dans le but de favoriser la publication des figures dans le texte, la Société décide de prendre à sa charge, à titre provisoire, la reproduction des dessins qui accompagnent les communications destinées à être insérées dans le *Bulletin*. Une nouvelle décision modifiera ultérieurement le Règlement à cet égard, si l'expérience en démontre la possibilité.

Communications.

Synonymies de Coléoptères paléarctiques

par L. BEDEL.

La publication très prochaine d'un nouveau Catalogue des Coléoptères d'Europe m'oblige à signaler brièvement les synonymies suivantes, sauf à donner plus tard les explications qui seraient nécessaires pour quelques-unes d'entre elles :

Broscus crenicollis Schauf. (in litt.) = *B. insularis* * La Br., 1867.

Sphodrus parumstriatus * Fairm., 1872 (1), = *Platyderus languidus* * Reiche, 1855 (ex Oriente).

Ptomaphagus sericeus Fabr., 1792, = *P. subvillosus* Goeze, 1777 (*villosus* Fourcr., 1785).

Hister fimetarius Herbst, 1792, = *H. bipustulatus* Schrank, 1781 (*bipustulatus* Oliv., 1789).

Hister bipustulatus || Fabr., 1798 (ex India), = **H. Daldorffi**, nom. nov. (1906).

Suprinus quadristriatus ‡ Hoffm., 1803 (non Payk.) = *S. rugiceps* Duft., 1805.

(1) Le *type*, dont la provenance restait ignorée, provient manifestement des récoltes de F. de Saulcy en Palestine. J'ai pu l'examiner grâce à l'extrême amabilité de M. J. Magnin, son possesseur actuel.

Aphodius cuniculorum * Mayet, 1904, = *A. (Melinopterus) Bonnairi* Reitt., 1892.

Pentodon dispar Baudi, 1870 (*balearicus* Kr. 1882, *syriacus* Kr., 1882, *cribratellus* * Fairm., 1893, *monodon* † Muls.), = *P. bispinosus* Küst. 1852 (sp. propria).

Rhizotrogus lanatus * Fairm., 1860 (patria falsa), = *R. tauricus* Blanch., 1850.

Rhizotrogus Reichei * Muls., 1871 (patria falsa), = *R. barbarus* * Luc., 1846 (e Mauretania).

Trichius rosaceus Kr., 1891, = *T. gallicus* Heer, 1841.

Trichius gallicus † Reitt. (non Heer), = **T. sexualis**, nom. nov. (1906).

Anthocomus rufus Herbst, 1784, = *A. coccineus* Schall., 1783.

Gen. *Theca* Aubé, 1861, = *Stagetus* Woll., 1861 (nom. prius).

Asida obesa * All., 1868 (patria falsa), = *A. sabulosa* Goeze, 1777.

Gen. *Dendarus* [Latr., ined.] Lap., 1840 (*Pandarus* † Muls., 1854, = *Phylax* Brullé, 1832).

Gen. *Heliopates* † Muls., 1854 (*Heliophilus* † Steph., 1832). = **Heliocaës**, nom. nov. (1906).

Gen. *Olocrates* Muls., 1854 (*Heliopates* Redt., 1845 et 1849), = *Phylan* Steph., 1832.

Gen. *Phylax* † Muls., 1854 (non Brullé), = **Neophylax**, nom. nov. (1906).

Alphitobius diaperinus Panz., 1797, = *A. piceus* Oliv., 1792 (*oryzae* Herbst, 1799).

Alphitobius diaperinus † Muls., Seidl., = *A. oratus* Herbst, 1799 (*fagi* Panz., 1799).

Gen. *Palorus* Duv., 1861, = *Caenocorse* Thoms., 1859 (1).

Corticeus rufulus Rosenh., 1847 (*insidiosus* Muls., 1854), = *C. suberis* * Luc., 1847 (nom. prius).

Brachycerus Cherrolati Fährs., 1840, = *B. callosus* Schönh., 1833.

Gen. *Stolutus* Muls. et God., 1873, = *Lachnaeus* Schönh., 1826.

(1) Nom féminin.

Gen. *Macrotarsus* || Schönh., 1842, = **Macrotarrhus**, nom. nov. (1906).

Anthribus (Brachytarsus) fallax Perris, 1874, = *A. tessellatus* Bohem., 1829.

Anthribus (Brachytarsus) areolatus Bohem., 1845 (*pardalis* Woll., 1861). — Type du genre *Trigonorrhinus* Woll., 1861.

Scolytus pruni Ratz., 1837, = *S. mali* Bechst., 1805.

Prionus coriarius L., 1758, = *P. tridentatus* L., 1758 (nom. prius).

Gen. *Pachyta* || Serv., 1835, = **Neopachyta**, nom. nov. (1906).

Gen. *Liagrica* Costa, 1855 (*Exilia* Muls., 1863), = *Penichroa* Steph., 1839.

Liagrica (Exilia) timida Mén., 1832, = *Penichroa fasciata* Steph., 1831 (sub *Callidium*).

Gen. *Pharus* || Muls., 1851, = **Pharoseymnus**, nom. nov. (1906).

Mœurs du *Bolboceras gallicum* Muls. [Col.]

par L. BÉGUIN.

Jusqu'ici le *Bolboceras gallicum* Muls. semblait introuvable sinon sur les bords de la Méditerranée.

Un entomologiste de mes amis, M. Taxil, habitant Riez (Basses-Alpes) m'écrivit à ce sujet :

« Vous pouvez affirmer que le *Bolboceras gallicum* Muls. (en patois *lou tavan*) vit dans les Truffes, au moins pendant une partie de l'année. Il se montre au premier printemps, jamais avant Noël ; on le rencontre également dans les Truffes d'été, dites Truffes blanches (*Tuber aestivum*). Il devient même parfois une vraie calamité, car il détériore les plus beaux tubercules en y creusant ses galeries pour manger, sans doute, et non pour y pondre, car je n'ai jamais rencontré d'œufs ni de larves.

L'insecte est nocturne ; il passe la journée soit dans une Truffe, soit tapi à proximité des truffières, dans une galerie verticale, de 8 à 12 centimètres, très légèrement coudée à la base. Je ne l'ai jamais rencontré ailleurs.